

# FORMICPRO

## ad us. vet., imprägnierte Streifen

Für den Bienenstock für Honigbienen zur Behandlung und Kontrolle von Varroose durch die Varroamilbe bei Honigbienen.

### Anwendungsperiode

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



### 1. Auspacken

Formicpro Streifen auspacken, das Schutzpapier muss bleiben.



### 2. Auflegen

Die Streifen direkt auf die Rähmchen mit einem Abstand von 5 cm legen.



### 3. Fertig

Abschlussdeckel direkt über die Streifen ohne zusätzlichem Leerraum legen. Nach 7–10 Tagen können die Streifen entfernt und kompostiert werden.

Formicpro sind Ameisensäurestreifen für eine einfache Behandlung von mittelmässig bis stark befallenen Wirtschaftsvölkern. Der Abstand zwischen den Anwendungen soll mindestens einen Monat betragen.

- Flugloch immer komplett öffnen
- Wirkt bereits ab 10 °C bis in die verdeckelten Brutzellen
- Formicpro ist immer nach der Honigernte einzusetzen
- Nicht verwenden, wenn die Tagestemperaturen bei über 29.5 °C liegen
- Bei starkem und sehr starkem Varroabefall (> 10 tote Varroa pro Tag)

### Dosierung

- 2 Streifen pro Magazin
- 1 Streifen für CH-Beuten