

# FORMIVAR

## ad us. vet., Lösung

Ameisensäure zur Behandlung der Varroose der Honigbiene.  
**Für Liebig-Dispenser**



### Anwendungsperiode

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



### 1. Vorbereiten

Dochtpapier muss je nach Tagestemperatur und Beutesystem angepasst und auf die Grundplatte gelegt werden.



### 2. Befüllen

Tropfeinsatz entfernen und die Flasche mit der nötigen Dosierung auffüllen. Anschliessend Tropfeinsatz wieder aufstecken.



### 3. Auflegen

Flasche auf die Grundplatte mit angepasstem Dochtpapier aufsetzen. Durch den Tropfeinsatz läuft die Ameisensäure und verteilt sich auf das Dochtpapier.

Formivar 60% und 85% immer in Kombination mit Liebig-Dispenser einsetzen. Dank dem Dispenser erfolgt eine kontinuierliche und gleichmässige Verteilung der Ameisensäure. Die Intensität der Verdunstung wird über die Grösse des Dochtpapiers geregelt.

- Wirkt schnell und wirksam bis in die verdeckelte Brut
- Bei starkem und sehr starkem Varroabefall (> 10 tote Varroa pro Tag)
- Einstellung Dochtpapier grün für 60% und rot für 85%
- Flugloch immer komplett öffnen
- Vor Beginn der Behandlung kurz auffüttern
- Erste Behandlung nach der Honigernte, zweite Behandlung nach der Auffütterung im September
- Die Behandlung ist beendet wenn das Dochtpapier trocken ist.

### Dosierung

- Formivar 60%, 1l für 5–10 Völker
- Formivar 85%, 1l für 5–20 Völker

# FORMIVAR


## ad us. vet., Lösung

Ameisensäure zur Behandlung der Varroose der Honigbiene.  
**Für FAM-Dispenser**



### Anwendungsperiode

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



#### 1. Einfüllen

Formivar 70% in einen Becher einfüllen und auf das Schwammtuch träufeln.



#### 2. Einstellen

Öffnungsstufe je nach Tagestemperatur einstellen.



#### 3. Auflegen

Drehscheibe nach unten für eine optimale Verdunstung auf zwei Leisten legen.

Formivar 70% immer in Kombination mit FAM-Dispenser einsetzen. Dank diesem Dispenser erfolgt eine kontinuierliche und gleichmässige Verteilung der Ameisensäure.

- Kurz vor Beginn einfach kurz auffüttern
- Wirkt schnell und wirksam bis in die verdeckelte Brut
- Bei starkem und sehr starkem Varroabefall (> 10 tote Varroa pro Tag)
- Erste Behandlung nach Honigernte für 7 Tage
- Nach der Auffütterung, zweite Behandlung im September für 14 Tage

#### Dosierung

- 130 ml pro Anwendung
- einfache Einstellung dank Drehscheibe für eine, je nach Temperatur, angepasste Verdunstung
- Formivar 70%, 1l für 7 Völker