


THYMOVAR

ad us. vet., Verdampfungsplättchen

Für die Bekämpfung der Varroa-Milbe bei Bienen

Anwendungsperiode

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1. Auspacken

Thymovar Plättchen je nach Bedürfnis vorbereiten


Thymovar als Langzeitbehandlung und Schutz vor Reinvansion bei moderatem Varroa-Befall. Auch im Anschluss an eine Sprühbehandlung mit Oxuvar 5,7% oder nach einer Ameisensäurebehandlung einsetzbar. Geeignet für Ableger, Schwärme und im Mini-Plus System.

- Anwendung bei Tagestemperaturen zwischen 15–30 °C
- Sehr gut verträglich für Königin und Brut
- Bei geringem bis moderatem Varroa-Befall (< 5 tote Varroa pro Tag)

Anwendung

- Vor der Behandlung ist eine einmalige Fütterung empfohlen
- Erste Behandlung nach der Honigernte für 3– 4 Wochen
- Zweite Behandlung nach dem Auffüttern mit neuen Plättchen für 3– 4 Wochen

Dosierung



Schweizer Kasten

Dadant

Magazin 1 Zarge

Magazin 2 Zarge

Mini-Plus
½ pro Zarge



2. Dosieren

Je nach Beutetyp können die Plättchen einfach zugeschnitten werden.



3. Auflegen

Mit Schutzhandschuhen, die Plättchen mit 4–10 cm Abstand zur Brut direkt auf die Rähmchen legen.